49. 黄耆 A

- 來源 豆科膜莢黃者Astragalus membranaceus
 Bge.,蒙古黃者Astragalus membranaceus (Fish.)
 Bunge var. mongholicus (Bunge) Hsiao的根。晉
 者為同科多序岩黃者Hydesarum polybotrys
 Hand.-Mazz.的根。
- 藥材性狀 北耆(原生耆):為蒙古黃耆、亦有膜 莢黃耆,圓柱形,外表淡黃色,橫斷面中心鮮 黃色,外圈淺黃,即所謂「金井玉欄」,略帶 豆腥味。








Fig. 120 Astragalus adsurgens Pallas Leguminosae Japanese name : Manshû-momen-zuru



图 121-2 膜荚黄芪 Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. (张桂芝绘)
1. 根 2. 花枝 3. 花萼及雌、雄蕊 4. 雄蕊 5. 花瓣 6. 果序









图 68 多序署黄芪 Hedysarum polybotrys Hand. -Mazz. (李增礼、屈淑英绘) 1.根 2.花枝 3.花剖开示旗瓣、翼瓣、龙骨瓣 4.花萼剖开 5.雄蕊 6.雌蕊 7.果实








膜荚黄芪 Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge.



蒙古黄芪 Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. var. mongholicus (Bge.) Hsiao



华黄芪 Astragalus chinensis L.






扁茎黄芪 Astragalus complanatus R.Br.











19cm



55-4 晉耆

20cm







55-12 北耆王 30cm



55-13 北書{砂眼,裂紋,皮鬆肉緊} 1.3



55-14 内蒙黃耆(圓柱分枝上端粗,黃棕, 明縱皺溝,硬韌纖維) 19cm







55-19 黃耆(左3陝西右3甘肅家種) 19cm



55-20 白皮耆

20cm

北耆(原生耆)「金井玉爛」







北耆







■關者(黑皮者、正栽):為膜莢黃者,表面 黑褐色,菊花心明顯,習稱「皮鬆肉緊」。







■ 晉耆(紅耆):為多序岩黃耆,表皮紅棕色至棕褐色,灰紅棕色,皮部約右半徑的1/3-1/2,富粉性,粉質特多,氣微香,味甘甜。







晉耆飲片








北耆飲片














- ■一般炮製法 1.生黄耆。 2.蜜炙黄耆。
- ▶ 炮製目的 生黃耆擅於固表止汗,利水消腫,托毒排膿。蜜黃耆益氣補中。








■ 一般炮製法 1.生黃耆:揀去雜質,除去 殘留的根頭和空心較大者,清水洗淨, 撈出,潤透,切2mm,厚片或斜片,晒乾。















- 蜂蜜有甘緩益元的作用,蜜炙黃耆,能增加溫補潤肺作用。多用於中氣不足,肺氣虛弱的患者。
- 2. 黄耆內含有Betaine(甜菜鹼)是吸潮性結晶體,極易溶於水。因此,在軟化切片時,不宜用水泡,以潤透為妥,防止Betaine溶解。





■品質鑑別 以身乾,獨枝無叉,條粗長皮 光皺紋少,質堅而韌,不易折斷,切面 皮部白色,木部鮮黃色,粉性足,呈「 金井玉欄,金盞銀盤」明顯,不纖維性 大,味甜,無黑心和空心裂隙者為佳。 北者以豆腥味強為佳。







- ■2.金井玉欄:橫斷面中心鮮黃色,外圈白 色或淺黃,即所謂「金井玉欄」。
- ■3.空頭:關者蘆莖切口處正圓形,中央常 有枯空,呈黑褐色的洞,習稱「空頭」





- 4.砂眼:根類藥材的表面散有凹腐狀小孔 ,稱稱「砂眼」,如黃耆的表面等。
- 5. 庫倫耆:亦稱「正耆」。是指產於蒙古 的黃耆,習慣認為質量最好。
- 6. 裂紋:一般是指藥材乾燥後斷面上形成的裂開部分。如黃耆、南沙參等。
- ■7.綿黃耆:亦稱「綿耆」。是指產於山西 綿上(即今沁源至沁縣一帶)的一種正品黃 者,也因其柔軟如綿而得名。又因其根 較長,形似箭桿,故又有「箭黃耆」之 稱。





台灣市場品

- 晉耆、北耆、白皮耆、黑皮耆、綿耆、 炮台耆、小綿耆。耆字常寫芪字。
- ■1.晉書:又稱紅書、川書,主產甘肅,由四川集散。晉書係以人工栽培,自產地收成後,即包紮成把狀輸出,分大把、中把、小把三類包裝,統一包裝規格長度為15cm,其外圍枝幹寬度一致。把內為斷枝,不整齊類。除外,亦有散裝者,分特、1~3等。





■2.北耆(白皮耆),產於內蒙古、山西、陝西,本類係這些產地黃耆之泛稱,冲口者產山西省渾源縣,又稱渾源耆。主要為家種,部份野生,雖也有經過人工整理,但包裝都是散裝,包裝並不講究, 甚為散亂。分1~4等。





■3.黑皮者(關者、正者):主產於黑龍江齊 齊哈爾(舊稱小卜奎)、吉林省的寧安縣(舊稱寧古塔)、興安省、內蒙古;歷史上 按產地分卜奎耆、寧古塔耆、正口耆。 外皮淺黑色或灰色,皮鬆肉緊,切斷面 ,組織緊密,外圈有淡黃色環紋,內心 深黄色,有油潤性,射線如菊花紋,味 甘甜。分為特、1~3等。





■除上述外,白皮者類之渾源者,選其係 大皮嫩者,以青葉煎汁、黑礬、及少許 五倍子煮之,染成黑色,仿內蒙古產之 「正口者」稱「冲正芪」,又名黑皮芪 。其黑色較上述者濃黑。

■ 4.綿耆:產於山西,以綿產品著稱,特點 是條短,質柔,而富粉性。沒有北耆帶 腥臭味。





■ 5.砲台書:渾源書,選其條大皮嫩染黑做「沖正芪」。挑條中勻質嫩的,切去頭尾,經沸水撩過,使其條乾柔潤,用板搓直,晾乾,過去札成把子如砲台形, 故名砲台書,現在改用散枝裝,分為正副砲台書。





- 6.小綿耆:為渾源耆,選做沖正,剔下細條,稱小綿耆。
- ■產於黑龍江稱為「關芪、正芪、口芪、 正口芪、黑皮芪」,其來源主為膜莢黃 耆。產於山西稱「北芪、白皮芪、原生 芪、山西芪、渾源芪」,其來源主為蒙 古黄耆。栽培於內蒙古、陝西、山東、 河北等之引種黃耆,亦屬此類。產於甘 肅稱「晉芪、紅芪、川芪」,其來源主 為多序岩黃耆。





晉者, 北耆, 切斷面有明顯環紋, 皮部 與肉部緊貼,由於具有粉質甚多,飲片 結構甚為緊密,用手指觸摸飲片面甚為 平滑,中心部位鮮黃色,略帶油脂,外 圈部位為淺黃色,質地堅韌,味道甘而 带甜,一般老藥店稱此種飲片為「金井 玉欄」。然後取一片飲片,以舌頭沾少 許唾液於飲片面上,若顏色轉化為黃綠 色則為晉耆或北耆。晉耆、北耆片氣味 撲鼻,尤其北耆帶豆腥臭。





- 預防生蟲,每屆5月,用硫黃燻一次及 攤晒;立秋節前後可再燻晒一次。如已 蟲蛀嚴重,可及時加工切成飲片,以免 遭受更大的損失。加工染成黑色的「冲 正芪(黑皮耆)」則易於保管。
- 夏季應經常檢查、燻晒;上檔貨最好 貯存於冷藏庫中,以防蟲霉。





臨床應用

■補氣升陽、固表止汗、托瘡消炎、利尿 藥。用於: 1.慢性虛弱, 中氣虛弱, 病 後虛弱,內傷勞倦,消瘦,氣虛下陷所 致各種虛弱症。 2.脾胃虛弱,食慾減退 ,瀉痢。 3.內熱盜汗及表虛自汗。 4.氣 虚者,其癰瘡久不癒,長久不潰破或潰 後久不癒。 5.急慢性腎炎、水腫。 6.消 渴證(糖尿病)。






■比較 (一)生用: 1.固表止汗,治衛氣不 固,表虚自汗、體虚感冒,如玉屏風散 、牡蠣散。 2.利水消腫,治風水證,如 防己黄耆湯、防己茯苓湯。 3.托毒排膿 , 癰疽難潰, 如千金內託散、透膿散、 **黄耆人參牡蠣湯、托裏透膿湯。**

麻木, 祛風濕, 如蠲痹湯。





■ (二)蜜炙:補益脾氣肺氣,兼有潤燥作用,治肺虚、氣短、勞倦、氣虚便秘,脾胃虚弱,一切氣衰血虚之證。如補中益氣湯、補肺湯、黃耆湯、人參養榮湯、歸脾湯、參茸衛生丸、黃耆建中湯。







- ■明年106年增訂再版
- ■用照片寫歷史 傳世藏書名著

- ■郵政劃撥 0026609-8 張賢哲
- 約3600元
- **04-22344375**





道地藥材圖鑑(-)

賢



道地藥材圖鑑(三)

張賢哲

中國醫藥大學

中國醫藥大學

道地藥材圖鑑(四)

道地藥材圖鑑(三)

張賢哲

張 賢哲

中國醫藥大學

道地藥材圖鑑(五)

張 賢哲

中國醫藥大學

道地藥材圖鑑(六)

張賢哲

中國醫藥大學

SO SON SON